

BAĞLARDA İLAÇLAMA PROGRAMI

İLAÇLAMA ZAMANI	HASTALIK / ZARARLI ADI	ETKİLİ MADDE ADI
İlk ilaçlama yaprakların %70-80' i döküldüğünde %4'lük, İkinci ilaçlama gözler uyanmadan önce %1-2'lik	Mantarı Hastalıklar	Bordo Bulamacı
GÖZLER UYANMA ZAMANINDA Gözlerin uyanmaya başladığı dönemde, 25 asmada 10 zarar veya zararlı görülürse ilaçlama yapılmalıdır	Bağ Maymuncuğu	Alphacypermethrin, Lambda-cyhalothrin
SÜRGÜNLER 20-25cm OLDUĞUNDA	Bağ Mildiyözü / Bağ Küllemesi	Bağ Mildiyözü; <i>Bacillus subtilis</i> , Bakırlı preparatlar, Propineb, Captan, Mancozeb, Folpet, Zoxamide Bağ Küllemesi; Azoxystrobin, Kükürtlü preparatlar, Triadimenol, Trifloxystrobin, Tebucanazole, Pyriofenone
ÇİÇEK SONRASI Taneler saçma büyüklüğüne ulaştığında	Bağ Mildiyözü / Bağ Küllemesi / Salkım Güvesi NOT: Çiçeklenme döneminde yağış olması durumunda Kurşuni Küf için ilaçlama yapılmalıdır.	Bağ Mildiyözü; <i>Bacillus subtilis</i> , Bakırlı preparatlar, Propineb, Captan, Mancozeb, Cymoxanil, Zoxamide Bağ Küllemesi; Azoxystrobin, Kükürtlü preparatlar, Triadimenol, Trifloxystrobin, Tebucanazole, Pyriofenone Salkım Güvesi; Abamectin, Azadirachtin, <i>Bacillus thuringiensis</i> , Lambda-cyhalothrin, Deltamethrin, Spinosad
TANELER NOHUT BÜYÜKKLÜĞÜ ALDIĞINDA	Bağ Mildiyözü / Bağ Küllemesi / Salkım Güvesi	Bağ Mildiyözü; <i>Bacillus subtilis</i> , Bakırlı preparatlar, Propineb, Captan, Mancozeb, Cymoxanil, Zoxamide Bağ Küllemesi; Azoxystrobin, Kükürtlü preparatlar, Triadimenol, Trifloxystrobin, Tebucanazole, Pyriofenone Salkım Güvesi; Abamectin, Azadirachtin, <i>Bacillus thuringiensis</i> , Lambda-cyhalothrin, Deltamethrin, Spinosad
TANELERE BEN DÜŞME DÖNEMİNDE Ben düşmenin başlangıcında ve 10-15 gün sonra olmak üzere ilaçlamalar tekrarlanmalıdır	Kurşuni Küf ve Salkım Güvesi NOT: Bu dönemde Külleme ve Mildiyö belirtileri var ise hasat zamanı dikkate alınarak, ilaçlamalar yapılmalıdır.	Salkım Güvesi; Emamectin benzoate, Indoxacarb, Cypermethrin, Deltamethrin, Lambda-cyhalothrin Kurşuni Küf; Boscalid, Fludioxonil, İmazalil, Folpet, Pyrimethanil

Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Tabloda yazılı etkili maddelerden, her hastalık için bir tanesi seçilerek ve dönüşümlü olarak kullanılmalıdır. İlaçların etki süreleri, son kullanma tarihleri, kullanım dozları ve birbirine karışabilme özelliklerine dikkat edilmelidir. Hasat ile son ilaçlama arasında geçmesi gereken süreye mutlaka uyulmalıdır. İklim şartları göz önüne alınarak uygulamalar tekrarlanmalıdır.

İlaç hazırlanırken-atılırken koruyucu giysi ve ekipman kullanımına özen gösterilmeli, emniyet kurallarına dikkatle uyulmalıdır. İlaç ambalajları uygun saklama koşullarında ve ilgisiz kişilerin ulaşamayacağı yerlerde depolanmalıdır. Boş olan ilaç ambalajları, çevre sağlığına dikkat edilerek atılmalıdır.