

- 15x15 cm boyutundaki plastik torbalar tohum ekimi için uygundur.
- Fideler 3-4 yapraklı olunca tarlaya 100x 150 cm ara ile dikilmelidir. Dikimden bir gün önce fideler iyice sulanmalıdır.
- Dikim sırasında fideler torbadan çıkartılırken torbalardaki harç dağıtılmamalıdır.
- Gübreleme için dikim öncesinde tarlaian alman örneklerde toprak analizi yapılmalıdır ve bu sonuçlara göre gübreleme yapılmalıdır.

### **BAKIM İŞLEMLERİ**

- Dikimden 10-15 gün sonra kavunlar, çapalanarak karıklar hazırlanır
- Kavunda sulama çok önemlidir. Tavında hazırlanan tarlada dikim esnasında can suyu bolca verilirse meyveler yumurta büyüklüğine gelinceye kadar toprağın bunyesine bağlı olarak sulama yapılmayabilir. Erken ve düzensiz sulama meyve dökümüne neden olabilir.
- Kavunda bir bitkide 2-3 meyve tutumundan sonra yan surgentenin alınması ve uç alma uygundur.

- Hastalık ve zararlara karşı mücadelede, tarımsal kuruluşlara danışarak uygun zamanda, doğru ilaç, doğru doz ve uygun ilaçlama aleti seçerek mücadele yapılmalıdır.
- Olgunişan meyveler, 2-3 cm uzunluktaki saplarıyla hasat edilmelidir.

**EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA  
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

P. K. 9 Menemen - 35661 İZMİR

Telefon : (0232) 846 1331 (pbx)  
 Faks : (0232) 846 1107  
 Teleks : 832 1293 aari-tr

©ETAE Matbaası - 1996

T.C.  
**TARIM VE KÖYİSLERİ  
BAKANLIĞI**  
**EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA  
ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

**ÇİFTÇİ BROŞÜRÜ** No: 70

**AÇIKTA ÇİNİKİZ KAVUNU  
YETİŞTİRİCİLİĞİ**

**Nurgül ÇARKACI**

### CEŞİT ÖZELLİKLERİ

İlk olgunluk süresi	105 gün
Hasat süresi	15 gün
Bitki büyümesi	Kuvvetli
Yaprak rengi	Yeşil
Yaprak büyüklüğü	Büyük
Meyve şekli	Banik yuvarlak
Meyve büyüğü	Orta
Meyve ağırlığı (ort.)	2 Kg
Meyve dış kabuk rengi	Sarı-yeşil benekli
Meyve kabuk yapısı	Düz
Meyve eti rengi	Yeşilimsi beyaz
Meyve eti kalınlığı	Kalm - 3 cm
Kabuk kalınlığı	Orta - 0.6 cm
Şeker oram (%)	10

Liflik	Lifsiz
Sulułuk	Çok sulu
Tohum rengi	Sarı
Tohum büyüklüğü	Orta
1 gram tohum adedi	22 adet
Olgunluk grubu	Orta
Venim	2000 Kg/da
Hastalıkla reaksiyonu	Kavun Sol- gunluğunca hassas

### HARÇ HAZIRLIĞI VE TOHUM EKİSİ

- Uygun harç karışımı :
- 2 kısım ahır gübresi, 2 kısım orman toprağı, 1 kısım dere kumu.
- 4 kısım ahır gübresi, 2 kısım bahçe toprağı, 1 kısım dere kumu.
- Çiftlik gübresinin iyice yanmış, dere kumunun 2-3 mm'lik dişli kum olmasına dikkat edilmelidir.
- Hazırlanan harçta  $1-2 \text{ kg/m}^3$  superfosfat gübresi eklenmelidir.
- Harç hazırlandıktan sonra mutlaka metil bromit ya da formaldehit ile ilaçlanmalıdır.
- Kavunda tohum ekimi mart başında yapılmalıdır.
- İlk sulama suyunu koruyucu ilaç karıştırmak yararlıdır.

### FİDE YETİŞTİRME

- Kavun yetiştirecek plastik torbalar harç ile doldurulup, fide yetiştirecek sera veya yastığa yerleştirilir ve tohumlar her torbaya 1-2 adet olarak 2-3 cm derinlige ekilir.