



İNCİR ARAřTIRMA ENSTİTÜSÜ  
MÜDÜRLÜđÜ

# İncirde İlekleme



Dr. ilknur KÖSOđLU  
Ziraat Müh.



## İncirde İlekleme


### İlekleme Nedir?


İncirde meyvenin tutup gelişebilmesi için ilek meyvelerindeki çiçek tozlarının ilek arıcığı tarafından incire taşınması gerekir. Bunun gerçekleşebilmesi için erkek ağaçlardaki ilek meyvelerinin dişi incir ağaçlarına asılması işlemine ilekleme denir.

### İlekleme Ne Zaman Başlamalıdır?

Mevsim şartlarına ve bahçenin bulunduğu yere göre değişmekle birlikte kır taban arazilerde Haziranın ilk haftası başlayıp son haftasına kadar devam eder.

Haziran ayında, incir meyveleri iri fındık büyüklüğünde (1,0-1,5 cm) ve parlak bir görünüm kazandığında ileklemeye başlanır.





İlekleme olgunluğuna gelmiş olan erkek meyveler çeşitlere bağlı olmakla birlikte iri ceviz büyüklüğüne gelmeli, olgunlaşmalı ve ağız bölümünden sıkıldığında çiçek tozları görülmelidir.







### Kullanılacak İlek Miktarı Ne Olmalı?

Ağacın büyüklüğüne, kış yağışlarının durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Normal şartlar altında ağacın 3 farklı yerine ilek filerinin içersine 3-4 meyve konarak bir hafta aralıkla iki defa yapılır. Kuraklığın ve ilek meyvesinin temininde sıkıntıların görüldüğü yıllarda ilk atımda 2-3 ilek meyvesi yeterli olacaktır, çünkü bir TEK ilek meyvesinde 300 ile 800 arasında ilek arıcığı vardır ve 1-2 arıcığın meyve içine girmesi yeterlidir. Çok ilek kaliteli ürün demek değildir!





### İlekleme Nasıl Yapılmalı?

İleklemeye sabahın erken saatlerinde başlanmalı, rüzgarlı ve yağışlı saatlerde ara verilmelidir.

İlek meyveleri ilek fileleri içerisine konmalı ve ağaçlara toplama kolaylığı nedeni ile tel kancalar vasıtasıyla asılmalıdır.









Sağlıklı İlek



**Sağlıklı İlek**

### **İleklemede Nelere Dikkat Edilmelidir?**

Sağlıklı ve temiz ilek kullanılmalıdır. Dışı yarasız ve yeşil renkte olmalı içinde sararma veya kahverengileşme olmamalı. Bu durumdaki ilekler incirde iç çürüklüğü ya da akma dediğimiz hastalığın en önemli sebebidir.



**Hasta ilek ile döllenmiş meyvede iç çürüklüğü**

İleklemede plastik fileler kullanılmalı. Böylece hem zamandan kazanılmış olur hem de ileklerin toplanması kolay olur.

Döleme yeteneğini kaybetmiş ilek meyveleri toplanıp imha edilmelidir. Ağaç üzerinde bırakılan meyveler aflatoksine neden olan küflere yataklık ederek riski artırırlar.

Aşırı ilekleme yapılmamalı. Aşırı ilekleme meyve tutumunun çok olmasına ve meyvelerin küçük kalmasına neden olur. Aşırı ilekleme meyvelerde akmaya, çürümeye ve ekşimeye neden olur.

Aşırı ileklemeyi önlemek için incir bahçelerinin içindeki ilek ağaçları kesilmeli, ayrı bir yerde ilek bahçesi kurulmalı

İncir üretiminde meyve tutumu sadece ilek arıcığı ile sağlandığı için kimyasal maddeler kullanılamaz !!!!



Hasta ilekler



Hasta ilekler

Sağlıklı ilekler



Hasta ilekler





**İncir Araştırma Enstitüsü** tarafından;

İlekleme sezonu boyunca müdürlüğümüzde görevli uzmanlar tarafından ilek pazarları ziyaret edilerek hem satıcılar, hem de alıcılar sağlıklı ileğin nasıl olması konusunda bilgilendirilir, talep edildiği takdirde bilgilendirme toplantıları düzenlenir.

Enstitümüzde üretilen erkek bitkiler erken, orta ve geç dönemde dölleme olgunluğuna gelen çeşitlerden oluşmak üzere tüplü fidan şeklinde satışa sunulur.





**Erkenci Çeşitler  
(1-10 Haziran)**

Ak ilek  
Kaba ilek  
Adalı  
Sarı ilek

**Orta Çeşitler  
(5-10 Haziran)**

Yanako  
Hamza  
Taşlık  
Kıbrıslı

**Geççi Çeşitler  
(10-20 Haziran)**

Armut ilek  
Mordemirtaş  
Karabulut  
Konkur

## Notlar

## Notlar



## Notlar

## Notlar

## Notlar



İncir Arařtırma Enstitüsü M¼d¼rl¼ę¼  
İncirlio¼a/AYDIN

T. 0.256.581 11 26 F. 0.256.581 11 24  
[www.arastirma.tarim.gov.tr/incir](http://www.arastirma.tarim.gov.tr/incir)  
[incir@tarim.gov.tr](mailto:incir@tarim.gov.tr)