

SIKÇA SORULAN SORULAR

| PROBLEM | NEDENİ | ÖNERİ |
|--|--|---|
| Ağaçların zayıflayıp, yaprakların sararması, yeterli ve kaliteli meyve miktarında azalma, ağacın kuruyup ölmesi | Kök Uyuzu | Derin fidan dikiminden ve hastalık nedeniyle kuruyan ağaçların yerine yeni fidan dikiminden kaçınılmalıdır. Hasta ağaçların kökleri açılmalı ve güneşe maruz bırakılmalıdır. Gereksiz ve derin toprak işlemeden kaçınarak toprak işleme aletleriyle köklerde yara açılmamalıdır. Suyun kök bölgesinde toplanması engellenmelidir. Hasta ağaçların kök boğazı açılıp 750 gr katran + 250 gr göztaşı karıştırılıp sürülmelidir. |
| Sürgünlerde büyümenin duraklaması ve zayıflama, sürgün ve ince dallarda hafif şişlik, kararma ve koyu renkli zamk salgılanması | Çelik Marazı | Yeni bulaşma görülen ağaçların hasta kısımları bir kısım sağlam kısımda dahil olacak şekilde kesilmeli ve yara yerine Borda Bulamacı ve/veya aşı macunu sürülmelidir. |
| Meyvelerde akma, meyve içinin sulu hale gelip ekşimelerin olması | -İç çürüklüğü hastalığı, -Ekşilik böceği zararı | Sağlıklı ilek kullanılmalıdır. Fazla ve aşırı miktarda ilek atılmamalıdır. Ekşilik böceği tuzakları meyve olumundan önce asılmaya başlanıp tüm hasat süresince kullanılmalıdır. Çürümüş bozulmuş meyvelerin imha edilerek bahçenin temiz tutulması |
| Taze incir meyvelerinde kurtlanma | -Ekşilik böceği, sirke sineği, kurtluca zararı | Ekşilik böceği tuzakları meyve olumundan önce asılmaya başlanıp tüm hasat süresince kullanılmalıdır. Çürümüş bozulmuş meyvelerin imha edilerek bahçenin temiz tutulması |
| Kuru incirlerde kurtlanma | Kurutma ve depolama şartları | Ürünü kerevetlerde kurutma ve depolanma aşamasında incir kurdu kelebeğinden uzak tutmak için kerevetler akşamları örtülmelidir. Depo, kuru incir konmadan 20 gün önce temizlenerek ilaçlanmalıdır. Zararlıının (kelebeğin) depoya girişi engellenmelidir. Özellikle kuru incir seçimi akşam saatlerinde ışık altında yapılmamalıdır. |

| | | |
|--|--|--|
| Meyvenin olgunlaşmadan dökülmesi | -Yetersiz ilekleme, -Kurtluca | Ağacın büyüklüğüne göre yeterli miktarda ilek asılmalıdır. Kurtluca (incir sineği) mücadelesi henüz bilinmemekte olup, dökülen meyvelerin imhası, bahar ayındaki toprak işlemenin kışlaklardan çıkış oranını düşüreceği bilinmektedir. |
| Yaprak üzerinde kahverengi, pas görünümlü lekeler, yaprak dökümü | İncir pası | Dökülen yaprakların toplanarak imha edilmesi, inokulum kaynağının azaltılması, düzgün budama ve bakım işlemleri ile ağaçların iyi havalanmasının sağlanması, aşırı nemden korunması sağlanmalıdır. Bakanlıkça tavsiye edilen ilaçlar ile uygun ilaçlamaların yapılması. |