

KAHVERENGİ KOKARCA VE MÜCADELESİ

Samuray Arıcık (1-2)

- Kahverengi kokarca Avrupa ve Asya'daki birçok ülke ile ABD dahil geniş bir coğrafyaya yayılmış ve ekonomik kayıplara neden olmuş istilacı bir böcektir.
- Tarım ve Orman Bakanlığı zararlı ile mücadelede başta biyolojik mücadele etmeni olan yumurta parazitoidi *Trissolcus japonicus* (Samuray arıcık) üretim ve salımı olmak üzere birçok mücadele yöntemini uygulanmakta ve en kısa sürede zararlı yoğunluğunu azaltmayı hedeflemektedir.
- Bu çalışmalara ek olarak vatandaşların da yapması gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

Kış Mücadelesi

- Çatı katları, bodrumlar, pencere pervazları, süpürgelikler, dış cephe çatlakları, tuğla içleri ve depoda bulunan kıyafet/kumaş araları gibi alanlar dikkatlice kontrol edilmeli, bulunan zararlılar toplanmalı ve imha edilmelidir.
- Böceğin yoğun olarak bulunduğu alanlar ruhsatlı çevre sağlığı ilaçlarıyla önerilen şekilde ilaçlanabilir. İlaçlama sonrası ölü böcekler alandan uzaklaştırılmalıdır.
- Sıvı deterjan damlatılmış su dolu leğene masa lambası ışığının yansıtılmasıyla karanlık ortamlardaki zararlıları yakalamada kullanılabilir.

İlkbahar ve Yaz Mücadelesi

- Zararlı, havaların ısınmasıyla beslenmek üzere tarımsal alanlara yönelmektedir.
- Zararlıının görüldüğü alanlarda il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine danışılarak ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılabilir. İlaçlamalar sabah erken saatlerde, topluca yapılmalıdır.

*Kışlaklara çıkış ve giriş zaman aralığında (Mayıs-Ekim arası) bahçelere ve yerleşim alanlarına yakın yerlere feromon tuzak asılmalı ve bu tuzakların bulunduğu ağaçlar ilaçlanmalıdır (İlaçlama anında feromonlar çıkarılmamalıdır). Feromonlar kesinlikle bahçelerin içine değil, dışarıdaki bir ağaca asılmalıdır.



TAGEM
ARICIK VE ENTOMOLOJİ

Kahverengi kokarca ve mücadelesi hakkında sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamalarını dikkate almanızı önemle rica ederiz.

